

Queensland Fruit Fly

Information in Traditional Chinese

AGRICULTURE VICTORIA

昆士蘭果蠅

昆士蘭果蠅對維多利亞州 24 億元的園藝產業構成重大威脅，要有效地控制昆士蘭果蠅，需有賴後園和商業種植者的積極參與。


昆士蘭果蠅毀壞各種水果和蔬菜，引致產量減少及導致不能食用。

最常見被果蠅毀壞的水果和蔬菜包括蕃茄、桃子、杏子、蘋果、梨、茄子、青紅椒、無花果、檸檬和橙。

昆士蘭果蠅在春季時的數量會隨著氣溫上升不斷增加，更可能會在一年內繁殖數次。

昆士蘭果蠅的生命週期

3. 卵子在 2-3 天後孵化成幼蛆蟲



的成蟲長約 7 毫米，呈紅褐色，有明顯的黃色斑紋。



結合以下方法來抑制後園的昆士蘭果蠅是最有效的做法。

驅趕：在樹木和植物上放置障礙物，以防止昆士蘭果蠅飛到果實上。 有效的選擇包括果蠅網、涼亭或袋，這些均可以從你當地的苗圃店或五金店購買得到。

保持果園衛生：當水果和蔬菜成熟時，要馬上採摘。 不需要的農產品和已經掉落或腐爛的農產品必須放在密封的塑料袋中，在陽光下放置五至七天，以消滅昆士蘭果蠅幼蟲。 不要將不需要的水果加入堆肥或蠕蟲農場，或直接放入垃圾桶。 考慮去除你不再需要和沒有時間打理的果樹。

定期檢測：大多數快要熟的水果會受到昆士蘭果蠅的毀壞，因此作出定期檢測是非常重要的，只需使用雄性果蠅陷阱或通過檢查水果表面損壞或蜇傷程度便可。

誘餌和誘捕：在昆士蘭果蠅毀壞水果之前設置陷阱和誘捕。陷阱和誘餌可以從五金店、苗圃店和網上購買。 尋找可撲滅雌性和雄性果蠅的捕捉器。

殺蟲劑：殺滅昆士蘭果蠅的殺蟲劑可從當地藥房或家庭園藝店等零售商處購買得到。

更多有關資料，可瀏覽 agriculture.vic.gov.au/qff 或致電 136 186 聯繫客戶服務中心查詢。